



LIPOTRIS™ Gel Liposomal

Tribosupplément intra-articulaire pour l'arthrose du genou
Lubrification articulaire avancée – 3 injections à une semaine d'intervalle

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Gel composite liposomal intra-articulaire

22 mg/ml Acide hyaluronique	0,8 mg/ml Liposomes POPC	2 ml Volume total	3 Injections genou
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------------

RÉSULTATS CLINIQUES À 2 ANS

Étude prospective, monocentrique, non randomisée – 50 patients – gonarthrose Kellgren-Lawrence grade II–III – 3 injections intra-articulaires à une semaine d'intervalle – suivi jusqu'à 2 ans.

Échelle	Valeur initiale	Amélioration moyenne à 2 ans
VAS – Douleur	5,5 ± 1,4	2,5 ± 1,9****
WOMAC – Score total	37,8 ± 19,5	10,4 ± 12,9****

- ⇒ **Douleur VAS : 5,5 ± 1,4 à l'inclusion, 2,0 ± 1,5 à 28 semaines et 2,5 ± 1,9 à 2 ans**
- ⇒ **WOMAC total : 37,8 ± 19,5 à l'inclusion, avec amélioration progressive jusqu'à 10,4 ± 12,9 à 2 ans**
- ⇒ **PROTOCOLE GENOU : 3 injections intra-articulaires de LIPOTRIS™ réalisées à une semaine d'intervalle**

	ÉTUDE CLINIQUE COMPLÈTE Scannez le QR code pour consulter l'étude LIPOTRIS™ publiée en 2026 – suivi jusqu'à 2 ans. https://tmi-medical.com/wp-content/uploads/2026/06/Etude-BioleVox-HA-ONE-12-mois.pdf <i>Étude prospective sur 50 patients. VAS et WOMAC évalués jusqu'à 2 ans ; 30 patients ont complété le suivi à 2 ans. **** p ≤ 0,0001 versus valeur initiale. Une diminution des scores VAS/WOMAC traduit une amélioration clinique.</i> <i>Document d'information destiné au professionnel de santé. Se référer à la notice et aux instructions d'utilisation du dispositif.</i>
---	--

INFORMATIONS ORDONNANCE : LIPOTRIS

Intitulé pour ordonnance :

LIPOTRIS (Gel Liposomal)
traitement en 3 injections
 Seringue préremplie 2,0 ml – 44 mg HA - POPC 1,6 mg

Service commandes pharmacies
 Email : contact@tmi-medical.com
 Tél : 03 10 45 26 66

Recevoir par email :

